

小学生～高校生相当年齢の予防接種スケジュール

国立感染症研究所 感染症情報センター

- 注1) 本スケジュール案は、2012年現在、接種可能な主なワクチンをすべて受けると仮定して1例を示したものです。接種の順番や受けるワクチンの種類については、お子様の体調や周りの感染症発生状況によって、異なってきます。詳しくはかかりつけの医療機関、保健所等でご相談ください。
- 注2) 接種に際しては次の決まりがあります。スケジュールを立てるときの参考にしてください。別の種類のワクチンを接種する場合は、以下のように接種することになっています。
- 「生ワクチンの接種後は、中27日(いわゆる4週間)以上あけて受けます。(例:月曜日に接種したら次は4週間後の月曜日以降に受けます。)」
- 「不活化ワクチン接種後は、中6日(いわゆる1週間)以上あけて受けます。(例:月曜日に接種したら次は翌週の月曜日以降に受けます。)」

小学生～高校生相当年齢の予防接種スケジュール

※ 日本小児科学会推奨案

- 生ワクチン** 別の種類のワクチンを接種する場合は、中27日(いわゆる4週間)以上あけて受けます。(例:月曜日に接種したら次は4週間後の月曜日以降に受けます。)
 - 不活化ワクチン** 別の種類のワクチンを接種する場合は、中6日(いわゆる1週間)以上あけて受けます。(例:月曜日に接種したら次は翌週の月曜日以降に受けます。)
 - 不活化ワクチン** 別の種類のワクチンを接種する場合は、中6日(いわゆる1週間)以上あけて受けます。(例:月曜日に接種したら次は翌週の月曜日以降に受けます。)
- 注射の生ワクチン
○ 注射の不活化ワクチン

小学生～高校生相当年齢の予防接種スケジュール

注) 本スケジュール案は、2012年現在、接種可能な主なワクチンをすべて受けると仮定して1例を示したものです。接種の順番や受けるワクチンの種類については、お子様の体調や周りの感染症発生状況によって、異なってきます。詳しくはかかりつけの医療機関、保健所等でご相談ください。

制度	学年	小学校1年生	小学校2年生	小学校3年生	小学校4年生	小学校5年生	小学校6年生	中学校1年生	中学校2年生	中学校3年生	高校1年生相当年齢	高校2年生相当年齢	高校3年生相当年齢	接種回数	
	年齢	6～7歳	7～8歳	8～9歳	9～10歳	10～11歳	11～12歳	12～13歳	13～14歳	14～15歳	15～16歳	16～17歳	17～18歳	ワクチンの接種	接種回数
定期接種	DT (ジフテリア・破傷風)						○(11歳以上13歳未満で1回)							DT (ジフテリア・破傷風)	1回
	MR (麻疹・風疹)							●2008～2012年度					●2008～2012年度	MR(麻疹・風疹)	1回
	日本脳炎				○(9歳以上13歳未満で1回):第2期									日本脳炎	1回
		○○○○※平成7年6月1日～平成19年4月1日生まれて4回の接種が終了していない場合は、4歳以上20歳未満で決められた接種間隔で足りない回数分接種 なお、平成24年度に8歳となる者及び9歳となる者への第1期初回接種、10歳になる者への第1期追加接種は積極的勧奨の対象となります。詳しくは、平成24年2月28日付厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知「日本脳炎の定期の予防接種について」の一部改正(健発0228第2号、薬食発0228第1号)をご確認ください。:第1期および第2期												日本脳炎	4回(不足分)
(任意接種)	水痘	●●●● 4週以上の間隔をあけて2回接種(2回の接種が終了していない場合は足りない回数分をこの期間に接種)												水痘	2回※(不足分)
	おたふくかぜ	●●●● 4週以上の間隔をあけて2回接種(2回の接種が終了していない場合は足りない回数分をこの期間に接種)												おたふくかぜ	2回※(不足分)
	インフルエンザ	○●●● 毎年10～11月に2～4週の間隔で2回接種(1回目と2回目は、できれば3～4週間空ける。遅くとも12月中旬までに2回目の接種を終了させる。)								●●●● または ●●●● (13歳以上は、毎年10～11月に1回(または1～4週間間隔で2回)遅くとも12月中旬までに接種を終了させる。)				インフルエンザ	毎年2回 または1回
	B型肝炎※	○●●● (4週間隔で2回、20～24週を経過した後に1回)3回接種												B型肝炎※	3回
	A型肝炎	○●●● (2～4週間隔で2回、24週を経過した後に1回)3回接種												A型肝炎	3回
進事業(任意接種)	HPV (ヒトパピローマウイルス) 2価または4価	○●●● 中1～高1相当年齢(自治体によっては小6～中3相当年齢)の女性:決められた接種間隔で(3回接種) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業でうけられる期間												HPV (ヒトパピローマウイルス) 2価または4価	3回

小学生～高校生相当年齢の予防接種スケジュール

お子様のスケジュールを書き込んで下さい。

※ 日本小児科学会推奨案


- 生ワクチン** 別の種類のワクチンを接種する場合は、中27日(いわゆる4週間)以上あけて受けます。
(例:月曜日に接種したら次は4週間後の月曜日以降に受けます。)
- 不活化ワクチン** 別の種類のワクチンを接種する場合は、中6日(いわゆる1週間)以上あけて受けます。
(例:月曜日に接種したら次は翌週の月曜日以降に受けます。)
-  定期接種・ワクチン接種緊急促進事業で受けられる期間
-  任意接種として接種可能な期間
-  4価のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンのみ

お子様の氏名		生年月日	年 月 日
--------	--	------	-------

小学生～高校生相当年齢の予防接種スケジュール

注) 本スケジュール案は、2012年現在、接種可能な主なワクチンをすべて受けると仮定して1例を示したものです。接種の順番や受けるワクチンの種類については、お子様の体調や周りの感染症発生状況によって、異なってきます。詳しくはかかりつけの医療機関、保健所等でご相談ください。

制度	学年	小学校1年生	小学校2年生	小学校3年生	小学校4年生	小学校5年生	小学校6年生	中学校1年生	中学校2年生	中学校3年生	高校1年生相当年齢	高校2年生相当年齢	高校3年生相当年齢	接種完了チェックリスト			インフルエンザ							
	年齢	6～7歳	7～8歳	8～9歳	9～10歳	10～11歳	11～12歳	12～13歳	13～14歳	14～15歳	15～16歳	16～17歳	17～18歳	ワクチンの接種	接種回数	ワクチンを接種したら、接種した年月日を書き込んで下さい			ワクチンを接種したら、接種した年月日を書き込んで下さい					
定期接種	DT (ジフテリア・破傷風)													DT (ジフテリア・破傷風)	1回				7歳					
	MR (麻疹・風疹)													MR (麻疹・風疹)	1回				8歳					
	日本脳炎													日本脳炎	1回				9歳					
任意接種 (定期外接種)	水痘													水痘	2回※ (不足分)				10歳					
	おたふくかぜ													おたふくかぜ	2回※ (不足分)				11歳					
	インフルエンザ													インフルエンザ	毎年2回 または 毎年1回	隣の表をお使い下さい→ 6～12歳迄は毎年2回 13歳以降は毎年1回			12歳					
	B型肝炎※													B型肝炎※	3回				13歳					
	A型肝炎													A型肝炎	3回				14歳					
	HPV (ヒトパピローマウイルス) 2価または4価														HPV (ヒトパピローマウイルス) 2価または4価	3回				15歳				
進事業 (任意接種)								自治体によってワクチン接種緊急促進事業の対象学年が異なる										16歳						
																					17歳			
																						18歳		



*1 D:ジフテリア、P:百日咳、T:破傷風を表す。
 *2 原則としてMRワクチンを接種。なお、同じ期内で麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者、あるいは特に単抗原ワクチンの接種を希望する者は単抗原ワクチンを接種。
 *3 第1期で受けそびれていた人も、この年齢で残りの回数定期接種として受けられます。なお、平成24年度に8歳となる者及び9歳となる者への第1期初回接種、10歳になる者への第1期追加接種は積極的勧奨の対象となります。詳しくは、平成24年2月28日付厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知「日本脳炎の定期の予防接種について」の一部改正(健発0228第2号、薬食発0228第1号)をご確認ください。
 *4 2008年12月19日から接種開始。生後2ヵ月以上5歳未満の間にある者に行うが、標準として生後2ヵ月以上7ヵ月未満で接種を開始すること。接種方法は、通常、4~8週間の間隔で3回皮下接種(医師が必要と認めた場合には3週間間隔で接種可能)。3回目の接種後おおむね1年の間隔をおいて、1回皮下接種。接種開始が生後7ヵ月以上12ヵ月未満の場合は、通常、4~8週間の間隔で2回皮下接種(医師が必要と認めた場合には3週間間隔で接種可能)。2回目の接種後おおむね1年の間隔をおいて、1回皮下接種。接種開始が1歳以上5歳未満の場合、通常、1回皮下接種。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象。
 *5 2009年10月16日に薬事法に基づき製造販売承認され、2010年2月24日から国内での接種開始。生後2ヵ月以上7ヵ月未満で開始し、27日間以上の間隔で3回接種。追加免疫は通常、生後12~15ヵ月に1回接種の合計4回接種。接種もれ者には、次のようなスケジュールで接種。生後7ヵ月以上12ヵ月未満の場合：27日以上の間隔で2回接種したのち、60日間以上あけて追加接種を1歳以降に1回接種。1歳：60日間以上の間隔で2回接種。2歳以上9歳以下：1回接種。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象。
 *6 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象。左記事業の対象年齢は、13歳になる年度から16歳になる年度の者(あるいは12歳になる年度から15歳になる年度の者)
 *7 妊娠中に検査を行い、HBs抗原陽性(HBe抗原陽性、陰性の両方とも)の母親からの出生児は、出生後できるだけ早期及び、生後2ヵ月にHB免疫グロブリン(HBIG)を接種、ただし、HBe抗原陰性の母親から生まれた児の場合は2回目のHBIGを省略しても良い。更に生後2,3,5ヵ月にHBワクチンを接種する。生後6ヵ月後にHBs抗原及び抗体検査を行い必要に応じて任意の追加接種を行う(健康保険適用)。
 *8 ロタウイルスワクチンは初回接種を1価で始めた場合は「1価の2回接種」、5価で始めた場合は「5価の3回接種」となります。