


年齢/年齢群別の破傷風予防接種状況, 2006年

～ 2006年度感染症流行予測調査より ～




接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者

[n=66] [n=73] [n=290] [n=638] [n=103] [n=551] [n=243]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2006



接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者 ■ 接種歴不明者

[n=66] [n=73] [n=290] [n=638] [n=103] [n=551] [n=243] [n=1621]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2006